

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 50kg
- 활력징후: BP 123/67 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.0°C

■ 요약

59세 여성 환자로, 3개월 전 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 혈압약을 복용 중이다. 찬바람에 요통이 악화되고, 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 대변은 흑색 연변을 보이며, 오한을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 155cm, 체중은 50kg, BMI는 20.8이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 띤다. 특히 야간에 통증이 심해지며, 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 찬바람에 노출 시 통증이 심해지고, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 현재 호전 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도 강도로 규칙적으로 하는 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 23일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회 정도 보며, 야간뇨는 1회 있다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 5점 만점에 True이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통, 오래 서있으면 악화, 한통, 득온즉감의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/67 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 약간 있으며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 황태, 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭