

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 23세 / 남
- 신장/체중: 191cm / 63kg
- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.1°C

■ 요약

23세 남성 환자로, 3개월 전 이사 중 허리 부상 이후 발생한 요통과 소화불량을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 191cm, 체중은 63kg, BMI는 17.3이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였으며, 점차 악화되는 추세이다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는 경향이 있다. 또한, 소화불량을 호소하며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다. 악화 요인으로서는 기름진 음식과 음주가 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중.

【가족력】

특이 가족력 없음.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통의 성질을 가진다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력함을 느끼고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움을 느끼며, 면색은 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설.
- 설태: 백태, 후태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부색