

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 65kg
- 활력징후: BP 113/76 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.7°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 소화불량, 수족냉증, 잦은 기침, 이명, 난청, 어지럼증을 동반하고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 65kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 계단에서 넘어진 후 요통이 발생하였으며, 점차 호전되는 경과를 보이고 있다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이

악화되고 온찜질이나 스트레칭 시 완화된다. 습한 환경, 스트레스, 음주 시 통증이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 매일 음주를 한다. 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통(2/5)이 있다. 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 쓴맛을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘려도 상쾌한 느낌이 없다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/76 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.7℃, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 든다. 피부는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭