

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:05:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 32세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 56kg
- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 86/분, 체온 36.1°C

■ 요약

32세 남성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원함. 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 경직이 시작되었으며, 이상지질혈증을 앓고 있고 관련 약물을 복용 중임. 변비, 야간 도한, 오한 등의 증상을 동반하고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 56kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 동안 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 묵직하고(重痛), 이동성이 있으며(遊走痛), 찌르는 듯한 양상(刺痛)을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 악화되고, 온찜질이나 휴식을 취하면 완화된다.

환자는 또한 이상지질혈증을 앓고 있으며 관련 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 목직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯한 양상이다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/93 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥