

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 71kg
- 활력징후: BP 115/70 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.6°C

■ 요약

47세 남성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내의 요통을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 습한 환경과 음주 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 71kg, BMI는 24.3이다.

【주소증】

발현 시점은 3개월 이상에서 6개월 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다. 현재 호전 중인 상태이다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 요통을 호소하며, 통증은 주로 허리 부위에 나타난다. 통증의 양상은 무겁게 느껴지는 중통, 이동하는 듯한 유주통, 찌르는 듯한 자통, 밤에 심해지는 야간통의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 습한 환경과 음주 시 증상이 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 상태는 보통이다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/70 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조하며, 각질과 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 황태와 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부색