

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:19:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 64kg
- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 86/분, 체온 38.3°C

■ 요약

73세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 64kg, BMI는 22.9이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 전부터 요통을 호소하며, 통증은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(留注痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 환자는 통증 강도를 1/10으로 표현했다.

【과거력】

고혈압과 이상지질혈증을 앓고 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감, 신물, 구고(口苦), 부패취(腐敗臭)가 느껴질 때가 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 묽게 또는 연변으로 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 38.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴