

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:13

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 73세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 80kg
- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

73세 남성 환자로, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 수면 부족 시 악화되며, 소화불량과 함께 적색 혈뇨를 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 73세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 80kg, BMI는 26.1이다.

### 【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면

호전된다고 한다. 최근 수면 부족으로 증상이 악화되었다고 진술하였다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 0.0개피/일 하였다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애(0/5), 중도각성(0/5).
- 한열: 열감/더위탐, 열수를 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한(無汗), 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증 강도 3/10), 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth).
- 정신/정서: 기억력 저하, 의욕은 보통, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)
- 설태: 황태, 후태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약