

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:20:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 33kg
- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 66/분, 체온 38.4°C

■ 요약

10세 남환, 1년 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 주소로 내원. 오한, 흑색변, 혈뇨, 수족냉증, 전신에 멍, 무력감, 가려움, 이명, 어지럼 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 33kg, BMI는 16.1이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보이며, 특별한 악화 또는 완화 요인은 없다. 통증 강도는 2/10으로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게

하면 완화되는 경향이 있다. 동반 증상으로 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통이 2/5 정도 있다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 1회이다.
- 수면: 5시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 True/5 이다.
- 한열: 오한/추위를 심하게 타며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한, 전신에 땀을 흘리며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (상기 현병력 참고).
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 없는 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 38.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 절로 멍이 생기는 경향이 있고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대