

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 99kg
- 활력징후: BP 125/89 mmHg, 맥박 100/분, 체온 38.4°C

■ 요약

40세 남성, 현장직, 3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 호소하며 내원. 고혈압 병력 있으며, 과로 및 기름진 음식 섭취 시 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 99kg, BMI는 36.8이다.

【주소증】

3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 3개월 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛)의 양상과 함께 움직일 때 심해지는 유주통(moving pain)의 특징을 보인다. 야간에 통증이 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을

경우에도 악화된다. 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화불량을 가끔 호소하며, 신물(Acid Reflux), 구고(Bitter Taste), 부패취(Foul Belching) 증상 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변, 보통의 굳기.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 2회.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 평소 더위, 추위를 타지 않는 편이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀을 흘리는 도한(盜汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10. 중통 (Heavy) - 습, 유주통 (Moving) - 담음, 자통 (Stabbing) - 어혈, 야간통 (Worse at Night) - 어혈, 오래 서있으면 악화 - 기, 한통 (Cold Pain) - 한, 득온즉감 (Better w/ Warmth) - 한.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이나, 건망이 다소 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/89 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 38.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥