

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 93kg
- 활력징후: BP 175/101 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.9°C

■ 요약

55세 남성, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 스트레스와 과로 시 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 181cm, 체중은 93kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 장거리 비행 후 요통이 발생하였으며, 점차 악화되는 추세이다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 야간에 통증이 심해지고, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 오래 서 있으면 통증이

악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 섭취한다. 복만감과 복통이 있으며, 구역감과 신물 올라옴, 부패취의 트림, 구고가 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많으며, 발한 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해진다.
- 정신/정서: 기억력이 저하되었고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 175/101 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 절로 멍이 잘 든다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥