

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:21:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 67세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 81kg
- 활력징후: BP 107/70 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.9°C

■ 요약

67세 남성 환자로, 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환이 있으며, 수면 부족을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 178cm, 체중은 81kg, BMI는 25.6이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 악화되고, 따뜻하게 하면 다소 완화된다. 수면 부족 시

증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 현병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 묽은 변 또는 연변을 보며, 황갈색이다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 혈뇨 증상을 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/70 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥