

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:22:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 48kg
- 활력징후: BP 98/65 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.8°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 1주일 이내 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 현재 혈압약을 복용 중임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 48kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전 무거운 물건을 들다가 요통이 발생하였으며, 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이고 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는

양상을 보인다. 환자는 찬바람/냉기(冷氣)에 노출 시 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일, 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통(1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 12회, 야간 2회.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(True/5).
- 한열: 오한/추위를 잘 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상으로 나타나며, 강도는 1/10이다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 98/65 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설/태설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세