

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 48kg
- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.7°C

■ 요약

15세 남성 환자로, 1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다. 장시간 운전 후 허리가 뻣뻣해지기 시작했으며, 기름진 음식 섭취, 음주, 수면 부족 시 악화되고 온찜질 및 휴식 시 완화되는 양상을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 48kg, BMI는 18.5이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여 내원하였다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때마다 통증 부위가 바뀌는 유주통의 양상을 보인다. 또한 찌르는 듯한 통증이 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을

때 악화되고 따뜻하게 찜질하면 완화된다. 환자는 통증 강도를 1/10으로 표현하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있고, 부패취가 나는 트림을 하며, 신물이 올라오고, 쓴 맛을 느낀다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회 소변을 보며, 적색 혈뇨를 호소한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있으며, 다한 증상이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 뜨거운 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 다한 증상을 호소한다.
- 통증: 요통이 있으며, 둔하고 무거운 느낌, 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증, 야간에 심해지는 통증, 오래 서 있을 때 악화되는 통증, 따뜻하게 하면 완화되는 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5로 확인되었다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 혀의 크기는 작다.

- 설태: 황색의 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 홍삭