

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:15:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 80kg
- 활력징후: BP 113/77 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.0°C

■ 요약

80세 여성 환자로, 이사 중 허리 부상 이후 발생한 요통을 주소로 내원. 과거 음주력 있으며, 흑색변, 혈뇨, 무한, 오한, 수족냉증, 사지무력감, 가려움, 이명, 난청, 창백한 안색 등의 증상을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 80kg, BMI는 36.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생했으며, 통증은 지속적으로 오르내리는 양상을 보인다. 환자는 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)을 호소하며, 야간에 통증이 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다.

또한, 냉기에 노출될 때 통증이 심해지며, 따뜻하게 찜질하면 통증이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 평소 중간 강도의 운동을 한다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 상태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 전혀 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/77 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍은 정상이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다(大).
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다(厚苔).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥