

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 71kg
- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.0°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 1년 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원. 잦은 묶은 변, 혈뇨, 다한, 오한, 어지러움, 사지무력감 등을 동반하며, 스트레스에 취약하고 기름진 음식과 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 180cm, 체중은 71kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

1년 이상 지속된 요통으로, 통증 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이고, 오래 서 있을 때와 차가운 기운에 노출될 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다. 요통과 함께 잦은 묶은 변,

혈뇨, 다한, 오한, 어지러움, 사지무력감, 피부 각질 및 가려움증을 동반한다. 기름진 음식 섭취 및 수면 부족 시 증상이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 5개피/일, 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화는 보통, 오심 및 구토 증상은 경미(1/5)하게 있다. 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 허리 통증 외 다른 부위 통증은 없다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.0℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 어지러움(4/5)과 사지무력감을 호소한다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기는 大하다.
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥, 부삭