

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 134/86 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.9°C

■ 요약

26세 남성, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 고혈압 및 심장병 가족력 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

발현 시점 6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상에서 1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 비슷하게 지속되거나 오르내림이 있다. 통증 양상은 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 양상을 보인다. 통증 강도는 2/10으로 보고되었다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화 상태는 보통이며, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/86 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.9°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부에 가려움이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.

- 맥상: 삽맥이다. 복합맥상으로 미약하다.