

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:16:58

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 193cm / 64kg
- 활력징후: BP 170/101 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

41세 남성 환자로, 3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 묽은 변, 잦은 소변, 불면, 전신 무력감, 피부 가려움, 이명, 소화불량 등을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 193cm, 체중은 64kg, BMI는 17.2이다.

### 【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

### 【현병력】

3개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통이 지속적으로 악화되는 양상이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 경감되는 경향을 보인다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 특히 두부에서 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되고, 온찜질 시 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다. 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 170/101 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 든다고 한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 정상이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.

- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 완맥이다.