

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 46kg
- 활력징후: BP 113/75 mmHg, 맥박 117/분, 체온 37.0°C

■ 요약

76세 남성 환자로 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소하며 내원함. 과거 당뇨 가족력, 잦은 기침, 경변, 혈뇨, 오한, 무기력, 건조한 피부, 이명, 어지러움 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 46kg, BMI는 15.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 1주-1개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 호소한다. 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다. 온찜질 시 통증이 경감되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통이 간헐적으로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다. 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/75 mmHg, 맥박 117회/분, 체온 37.0°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 완맥