

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:17:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 87kg
- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 54/분, 체온 36.4°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 기름진 음식 섭취 및 무거운 짐을 들 때 악화된다. 변비, 혈뇨, 수족냉증, 무력감, 이명 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로, 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 87kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 요통은 장시간 운전 후 차에서 내릴 때 시작되었으며, 점차 악화되는 양상이다. 기름진 음식 섭취 및 무거운 짐을 들 때 악화되며, 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 두부에서만 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 36.4°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 혀의 크기는 작다.

- 설태: 황색의 니태(膩苔)를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 삼맥(澁脈)
- 복합맥상: 부색(浮)