

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 60kg
- 활력징후: BP 95/60 mmHg, 맥박 86/분, 체온 37.1°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 요통과 함께 소화불량, 잦은 기침, 이명, 어지러움 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 60kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

발현 시점 1주-1개월 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 완화되는

경향을 보인다. 환자는 요통 외에도 잦은 기침, 이명, 어지러움, 소화불량 등의 증상을 동반하고 있다. 발열은 없으나 저체온(35도 이하)을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않는 무한(無汗) 증상을 보인다.
- 통증: 요통은 2/10 강도이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상으로 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 95/60 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 37.1℃, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소한다. 부종은 없으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침실