

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 70kg
- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.3°C

■ 요약

29세 여성 환자로, 3개월 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 스트레스와 과로 시 악화되며, 온찜질과 식이 조절로 완화됨. 소화불량, 수면 장애, 수족냉증, 오한 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 149cm, 체중은 70kg, BMI는 31.5이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

환자는 3개월 전 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보인다. 특히 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있을 때

더욱 악화된다. 한기를 느끼는 통증으로, 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다. 스트레스와 과로 시 통증이 심해진다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라오는 증상이 있다. 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 (5/5)를 호소하며, 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10), 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없는 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 (3/5) 및 난청 (5/5)을 호소한다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기

- 설태: 백태, 다테

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부삭