

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 66kg
- 활력징후: BP 123/88 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.9°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 3개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 이사 중 허리 부상 이후 발생했으며, 과로, 음주, 스트레스에 의해 악화됨. 동반 증상으로 사지무력감, 소화불량, 잦은 땀, 오한 등이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 162cm, 체중은 66kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

발현 시점 3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 요통은 이사 중 허리를 삐끗한 이후 발생했으며, 호전되는 듯하다가 과로, 음주, 스트레스 상황에서 악화되는 양상을 보인다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain),

자통(stabbing pain), 야간통(worse at night)의 양상을 보이고, 오래 서있으면 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통 4/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/88 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.9℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색