

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:18:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 66kg
- 활력징후: BP 106/78 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.3°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 1년 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 음주와 수면 부족 시 악화되는 경향을 보임. 변비와 혈뇨를 동반하고, 무한증과 수족냉증을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 66kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소하며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 띤다. 특히 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 음주 및 수면 부족 시 증상이

악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 하루에 0개피, 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감과 복통을 가끔 호소한다. 부패취의 트림과 신물이 올라오며, 구고(口苦)를 느끼기도 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색이며 혈뇨를 보인다. 주간 6회, 야간에는 소변을 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 음료를 선호한다. 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에서 땀이 나지 않는다. 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다. 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/78 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명은 2/5 강도이며, 난청은 1/5 강도이다. 어지러움은 2/5 강도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍(絳紅) 및 자설(紫舌)이며, 크기는 대(大)하다.

- 설태: 황태(黃苔)이며, 두께는 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 부대(浮大)