

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:06:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 84kg
- 활력징후: BP 101/60 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.4°C

■ 요약

66세 남성, 3개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과로, 장시간 좌위, 무거운 물건을 들 때 악화되며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력 및 흑색변, 혈뇨, 수족냉증, 무력감, 피부건조, 이명, 어지럼증, 황색 면색 등의 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 84kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 뻣뻣하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지고, 찌르는 듯한 통증이 야간에 심화되는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

통증 강도는 1/10 정도로 경미한 수준이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중강도로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화는 보통이다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에서 나며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 뻣뻣하고 무거운 느낌, 움직일 때 심해지는 유주통, 찌르는 듯한 자통, 야간통, 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 따뜻하게 하면 완화되는 한통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/60 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴