

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:07:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 65kg
- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.1°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 1주-1개월 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 고혈압이 있으며, 장시간 앉아있거나 무거운 짐을 들 때, 음주시 통증이 악화되고 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 65kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 호전된다. 환자는 또한

수족냉증을 호소하며, 소화불량 증상으로 복만, 복통을 겪고 있으며, 구역, 신물, 부패취, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 과거 흡연력이 있으나 현재는 금연 중이다(0.0개피/일). 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통, 구역, 신물, 부패취, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 아침에 일어나면 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수(熱水)를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세