

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:08:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 63kg
- 활력징후: BP 114/80 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.5°C

■ 요약

57세 남성, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압을 가지고 있으며, 잦은 음주 습관이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 63kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

1개월 이상에서 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 지속된 요통을 호소하며, 증상은 악화되는 추세이다. 요통은 주로 허리 부위에 나타나며, 뻣뻣함과 함께 통증을 동반한다. 통증은 무거운 느낌, 움직일 때 심해지는 양상, 찌르는 듯한 느낌, 밤에 심해지는 경향을 보이며,

오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증과 고혈압을 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

환자는 가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 자주 하는 편이다. 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에는 보지 않으며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 잠이 얕고 아침에 일어나면 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 수면 중 자주 깬다(5회).
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리지만, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후에는 피곤하고 차가워지는 느낌이 든다.
- 통증: 허리 부위에 통증 강도는 4/10이며, 무거운 느낌, 움직일 때 심해지는 양상, 찌르는 듯한 느낌, 밤에 심해지는 경향을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/80 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍색을 띠며, 설체가 작다.

- 설태: 황색의 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥