

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 53kg
- 활력징후: BP 157/97 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.1°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 1개월 이상 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 혈압약을 복용 중이다. 최근 장시간 앉아있거나 과로 시 증상이 악화되며, 안정 시 완화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 53kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 전, 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통, 유주통,

자통의 양상을 보이고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다. 장시간 앉아있거나 과로 시 증상이 악화되며, 안정 시 완화되는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 중간 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 0회, 혈뇨를 보인다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 1점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통, 유주통, 자통의 양상이다. 통증 강도는 3/10, 야간에 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/97 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥