

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 87kg
- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.5°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 계단에서 낙상 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 고혈압, 당뇨 가족력이 있으며, 변비, 수면 장애, 전신 무한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 176cm, 체중은 87kg, BMI는 28.1이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 점차 악화되는 양상이다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 계단에서 낙상 후 요통이 발생하였으며, 통증 강도는 4/10으로 보고하였다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게

하면 완화된다고 호소한다. 또한, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 복만/복통을 호소한다. 오심/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 12회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)가 있으며, 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않는 무한(無汗)이며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다. 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해진다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대