

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 67kg
- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.0°C

■ 요약

59세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 허리 통증 시작. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 스트레스 시 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 67kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 통증강도는 3/10이다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있으면 악화된다. 냉기에 노출되면 통증이 심해지고, 따뜻하게 하면 완화된다.

스트레스에 의해 악화되며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 중풍의 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 복만/복통 3/5를 호소한다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통의 형태를 보인다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 2회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗)이 나타나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍들은 정상이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 백태, 후태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭