

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 83kg
- 활력징후: BP 136/84 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.8°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 고혈압 및 당뇨 병력을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 83kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 장시간 운전 후 허리 부위의 뻣뻣함과 통증이 발생하였다고 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 무거운 짐을 들거나 음주 시 통증이 심해진다.

【과거력】

고혈압 및 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역이나 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 짧고, 잠자리가 얇으며, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 찬 음료를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많이 나며, 전신에서 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/84 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.8℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지럼증이 4/5 정도로 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기가 크다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥