

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:09:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 74kg
- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원함. 장거리 비행 후 허리 통증이 시작되었으며, 이상지질혈증 및 고혈압 병력이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 74kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(True/5)와 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 다한(多汗) 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 대(Enlarged)한 설질이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색