

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 48kg
- 활력징후: BP 121/83 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.5°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거 추운 날씨에 야외 작업 후 허리 굳어짐을 호소. 오한, 전신 부종, 무력감, 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 48kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 8시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다. 환자는 스트레스에 의해 증상이

악화된다고 진술하며, 안정을 취하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 1점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에 땀이 나면 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/83 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.5℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허