

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 72kg
- 활력징후: BP 137/81 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.1°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 1주일 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 과거 이상지질혈증, 가족력으로 고혈압 및 당뇨가 있으며, 추운 날씨에 야외 작업 후 증상 발현 및 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 166cm, 체중은 72kg, BMI는 26.1이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

요통은 1주일 전 추운 환경에서 작업 후 발생했으며, 이후 점차 악화되는 양상이다. 통증은 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 또한, 감기

증상으로 저체온을 보이며 잦은 기침을 호소하고, 소화불량으로 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨의 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고, 중도 각성도 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 묵직하고, 이동성이 있으며, 찌르는 듯하고, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 무기력하며 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/81 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.1℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 멍이 쉽게 드는 경향이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 후태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭