

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 83kg
- 활력징후: BP 124/85 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.4°C

■ 요약

46세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원함. 과거 고혈압 가족력이 있으며, 수면 부족 및 장시간 앉아있는 습관이 악화 요인으로 작용함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 174cm, 체중은 83kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통으로 내원하였다. 요통은 잠을 잘못 잔 후 발생했으며, 이후 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 환자는 수면 부족과 장시간 앉아있는 자세가 통증을 악화시키며, 따뜻하게 하면 통증이

완화된다고 호소한다. 통증 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(留住痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 오래 서있으면 악화되는 양상, 한통(寒痛), 득온즉감(得溫則減)의 특징을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통 3/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질은 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/85 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰된다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭