

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 67세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 102/61 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.4°C

■ 요약

67세 남성 환자로, 1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 장시간 운전 후 갑작스러운 요통을 호소한다. 환자는 통증 강도를 2/10으로 표현하며, 통증 양상은 무겁고 움직이는 듯하며 찌르는 듯하고 야간에 심해지는 경향을 보인다고 한다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게

하면 완화되는 양상을 보인다. 수면 부족 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 바 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있으며, 부패취의 트림과 신물이 올라오며, 쓴 맛을 느낀다고 한다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은 색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 있으며 빈도는 5회이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/61 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 작다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥