

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 76kg
- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.7°C

■ 요약

58세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 1개월 이상 지속되었으며 악화 중. 과거력 상 고혈압 가족력이 있고, 음주와 과로 시 악화, 스트레칭과 수면 시 완화되는 경향을 보임. 소변에 혈뇨 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 76kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

발현 시점 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 환자는 통증 강도를 4/10으로 호소한다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 요통을 호소하며, 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만과 복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5/5, 중도 각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 회태이고, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥