

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:28:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 55kg
- 활력징후: BP 102/79 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.4°C

■ 요약

13세 남학생으로, 1주일 전 계단에서 넘어진 후 발생한 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 55kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

1주일 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 계단에서 넘어진 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지고 밤에 더욱 심해지는 경향을 보인다. 또한 오래 서 있으면 통증이 악화되며, 따뜻하게 찜질하면 통증이 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 있다 (2/5).
- 대변: 하루 1회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 허리 부위에 둔하고 무거운 통증을 호소하며, 통증 강도는 2/10이다. 통증은 움직일 때 심해지고 밤에 더욱 심해진다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/79 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이며 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 회색의 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약