

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 70kg
- 활력징후: BP 155/95 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.8°C

■ 요약

47세 여성 환자로 3개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있으며, 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족, 무거운 짐을 드는 행위가 증상을 악화시키는 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 70kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻐뻐하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있으며, 증상은 호전과 악화를 반복한다. 장시간 앉아있는 자세, 수면 부족, 무거운 짐을 드는 행위 시 통증이 악화되는 경향을 보인다. 요통의 양상은 묵직하고 무거운

느낌(重痛)과 함께 움직일 때 통증이 나타나는 유주통(流注痛), 칼로 찌르는 듯한 자통(刺痛)이 동반되며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 하루 5개피의 담배를 흡연한다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있고, 신물과 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 4회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 자지 못하며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 거의 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 묵직한 느낌, 움직일 때 나타나는 통증, 칼로 찌르는 듯한 통증, 야간에 심해지는 통증, 오래 서 있을 때 악화되는 통증, 따뜻하게 하면 호전되는 통증을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 스트레스에 대한 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/95 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.8℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 4/5이다. 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대