

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 66kg
- 활력징후: BP 149/90 mmHg, 맥박 82/분, 체온 37.4°C

■ 요약

31세 여성 환자로, 3개월 이상 6개월 이내 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 이사 중 허리를 삐끗한 후 증상이 시작되었으며, 흡연과 과로로 인해 악화되는 경향을 보인다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 66kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

발현 시점 3개월 이상 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였으며, 3개월 이상 지속되고 있다. 흡연과 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 통증 강도는 4/10으로 보고되었다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛),

야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때와 차가운 환경에서 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며 매일 음주를 하고, 흡연은 하루에 0개피 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/90 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 37.4℃, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실