

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 135cm / 32kg
- 활력징후: BP 115/76 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.7°C

■ 요약

11세 남환, 6개월 이상-1년 이내 발생한 요통을 주소로 내원. 잠을 잘못 잔 후 아침부터 허리 뻣뻣함과 통증을 호소하며, 오한, 수족냉증, 흑색변, 잦은 야간뇨 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 135cm, 체중은 32kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 호소한다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 요통은 주로 아침에 심하며, 오래 서 있을 때 악화되는 경향이 있다. 따뜻하게 하면 통증이 완화된다고 한다. 통증 양상은 묵직하고,

이동성이 있으며, 찌르는 듯한 느낌이 있고, 야간에 심해지는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만/복통을 1/5 정도로 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 3회.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 묵직하고, 이동성이 있고, 찌르는 듯한 느낌이 있으며, 야간에 심해진다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어지며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/76 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 없다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.

- 설태: 백태, 다테.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실