

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:29:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 68kg
- 활력징후: BP 120/85 mmHg, 맥박 114/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 3개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 최근 증상 악화 추세이며, 변비, 수면 장애, 다한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 68kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 장시간 앉아있거나 습한 환경, 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 특별한 완화 요인은 없다. 요통은 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을

보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서있을 경우에도 악화되며, 냉기에 노출되면 심해지고 따뜻하게 하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 매일 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경(Menopause) 상태이며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다. 복만/복통은 1/5 정도이며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 짧고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 야간에 도한(盜汗)이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통(重痛), 유주통(流走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/85 mmHg, 맥박 114회/분, 체온 37.8℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 느끼며, 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대