

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 59kg
- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.3°C

■ 요약

59세 여성 환자로 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 기저질환으로 가지고 있으며, 변비, 잦은 소변, 무한, 오한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 59kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통으로 내원하였다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래 서있으면 악화, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/

Warmth)의 양상을 보인다. 오래 앉아있으면 증상이 악화된다고 호소한다. 현재는 호전 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압과 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.3℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가렵다. 부종은 없다. 멍이 잘 든다. 어지러움이 3/5 강도로 나타난다. 이명은 거의 없으며(0/5), 난청은 경미한 수준(1/5)이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 완맥이다.