

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 76kg
- 활력징후: BP 109/73 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.2°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 요통은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다. 소화불량 증상과 전신 부종, 사지 무력감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 169cm, 체중은 76kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 7시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 추운 날씨에 야외 작업 후 요통이 발생하였으며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 통증은

중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화되는 경향을 보인다. 온찜질 시 통증이 경감되는 듯하다. 소화불량 증상으로 복만(腹滿) 및 복통(腹痛)을 호소하며, 수족냉증(手足冷症), 구역(嘔逆), 부패취(腐敗臭), 신물(酸水), 구고(口苦) 등의 증상이 동반된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 당뇨병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다. 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 잘 탄다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다. 야간에 심해지고 오래 서 있을 경우 악화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/73 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(大)하다.
- 설태: 백태, 니태(膩苔)하다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)