

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 58kg
- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 114/분, 체온 36.5°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1년 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 평소 흡연을 하며, 변비, 수족냉증, 얇은 수면, 기억력 저하 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 171cm, 체중은 58kg, BMI는 19.8이다.

【주소증】

발현 시점으로부터 1년 이상 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통이 지속적으로 나타나고 있다고 호소한다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 경향이 있다. 야간에 통증이 심해지며, 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보인다. 오래 서

있을 경우 통증이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 하루에 1.5개피 정도 흡연한다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역이나 구토 증상은 가끔 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고, 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색깔은 맑고, 주간에 4회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5)가 있으며, 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 많이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 둔통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/61 mmHg, 맥박 114회/분, 체온 36.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 니태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥