

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:30:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 147cm / 36kg
- 활력징후: BP 125/89 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.2°C

■ 요약

12세 남환, 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통으로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 36kg, BMI는 16.7이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 호전 중이다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고, 따뜻하게 하면 통증이 완화된다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 흡연, 스트레스 시 통증이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 섭취하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/89 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지럼증은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 대(大), 태(胎)하다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.

- 매력: 유력하다.
- 맥상: 완맥이다.