

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:31:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 68kg
- 활력징후: BP 104/60 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.5°C

■ 요약

67세 여성, 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 발생한 요통으로 내원. 득온즉감(得溫卽減)하며, 변비, 수족냉증, 어지러움, 사지무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 68kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

1주-1개월 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 요통이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주-1개월 전 무거운 물건을 들다가 허리 부위에서 '뚝' 소리가 나는 것과 동시에 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면

통증이 악화되고, 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 완화된다고 한다. 환자는 요통 외에도 수족냉증, 어지러움, 사지무력감을 호소하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 높다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통은 1/5 정도이며, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고(口苦) 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변은 황색을 띠고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 6회, 야간 5회 정도로 빈뇨가 있다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나 수면이 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/60 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다. 어지러움은 5/5 정도이다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴