

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:31:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 73kg
- 활력징후: BP 109/77 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.6°C

■ 요약

62세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 기름진 음식 섭취 및 습한 환경에서 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 73kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 요통을 호소하며, 통증은 묵직하고 무거운 느낌이며, 이동하는 듯한 양상도 나타난다. 쉬는 듯한 통증과 야간에 심해지는 경향이 있으며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다. 기름진 음식을

섭취하거나 습한 환경에 노출되면 증상이 악화된다고 한다. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 현재 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 15개피 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경되었으며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 생리통은 심하지 않았다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 묵직하고 이동하는 듯하며 쭈시는 듯한 통증이 있고, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 없으며 무기력하다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/77 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이다. 어지럼증은 없다. 환자는 저체온을 보이며, 발열 증상은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥