

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:57:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 78kg
- 활력징후: BP 144/93 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.7°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내 발현된 요통을 주소로 내원함. 과거력 상 고혈압 가족력이 있으며, 흡연력이 있고, 수면의 질이 좋지 않음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 163cm, 체중은 78kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 이상 3개월 이내부터 요통이 발생하였으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 찬바람/냉기(冷氣), 장시간 앉기(久坐), 과로(過勞) 시 악화되고, 식이조절(食餌調節)과 온찜질(溫熱敷) 시 완화된다고 한다. 통증은

중통(重痛), 유주통(moving), 자통(stabbing), 야간통(worse at night)의 양상을 보이며, 오래 서있으면 악화되고, 냉기에 노출되면 심해지며, 따뜻하게 하면 나아지는 경향이 있다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 1/5 정도이다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠이 얕고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/93 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.7℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태이며, 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)이다.
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)이다.
- 맥력: 무력(無力)하다.
- 맥상: 활맥(滑脈)이다.
- 복합맥상: 미약(微弱)하다.