

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 65kg
- 활력징후: BP 111/79 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.6°C

■ 요약

50세 남성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 삐끗한 후 발생. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 과거력. 오한, 무한, 흑색변, 혈뇨, 얇은 수면, 무기력, 암색 면색, 황후태, 부맥, 세맥, 활맥 등을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 65kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 짐을 나르다 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 통증은 3/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우

통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화되는 듯하다. 환자는 냉기에 노출되면 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받아 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 심장병 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량과 함께 복만, 복통을 3/5 정도로 호소한다. 구역감, 신물, 구고, 부패취를 동반한다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/79 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고 피부는 건조하며 각질이 있다. 가려움증은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태를 보이며, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥