

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:58:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 74kg
- 활력징후: BP 114/65 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.7°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 1주일 이내 발현한 요통을 주소로 내원. 과거 흡연력 있으며, 흑색변 및 혈뇨, 잦은 소변, 수면의 질 저하, 사지무력감, 피부 가려움 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 164cm, 체중은 74kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

1주일 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 책상에 앉아 일한 후 3일 전부터 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주일 전부터 요통을 호소하며, 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 야간에 심해지는 경향이 있으며 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구역감이 있으며, 썩은 냄새가 나는 트림을 하고, 신물이 올라온다. 입에서 쓴 맛이 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 보통의 굳기이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간에 12회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 없으나 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 더위나 추위를 타지 않으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10 정도이며, 묵직하고, 움직일 때 심해지는 양상이다. 야간에 심해지며, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 저하된 상태이다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/65 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.7°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴